Malvoisie de Lasseraz

Vass3R12s451-455

SINA Collection Vassal-Montpellier

Mynaming de and 2 1252

Photo GrappGenne 2008

Code Intro : **0Mtp677** Nom Var : Cépage non identifié Nom Intro : Malvoisie de Lasseraz

Emplacement: Vass3R12s451-455











Désignation: Malvoidie de Labercy

Clos Planche 9 Côté A No-124

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 24-9-56

4-0
2-0
3-2

Désignation: Molvaine de Laparoz

Clos Planche 9 Côté P No 1244

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité: 2.10-57

2-0

3-4

4-2

4-2

And 4

M. l. 1.9.1958 Fand

Malvoisie de Lassiraz Désignation:

Clos Planche 9 caté A No 124

Vigueur: 3

Charge :

Désignation: Malvoifil de Lasseraz Clos Planche 9 Côté H Nº 124

Vigueur: 2431.859 P-0

2 5 (8 rains pails) 3 2 (8 rains pails) 4 6 ? 5 111? Désignation: Malvarie de laneray

Dies Planche 9 côté A No 124

Vigneur: 4

Date de maturite 3.1-8.60

Charge:

S. 16 P-0

2 4

3 8

4 4 0

5 9

Molvoisi de Passera

Désignation:

Clos G Planche H coté 124 No

Vigueur: 2

Date de mâturité: 21.8.61

P.O

Charge:

S. 1.14

Mar 2 10

Mar 3 14

Mar 4 12

5.16

Désignation: Molvoini de Lasteraz Clos Planche J Rang A Souche 124 Vigueur: 3 V 6 9 8 64 Date de maturité: 30 - 9-62 Pourriture: 2 GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG - G - M - P.

(B) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:
saveur: s-m-ar-fox-herb.

s 1 21 Disc - sph - (11) - Ov. Obov - cyl - fus. s 2 22

s 3 24 avec pépins - apyrène

s 4 22 jus : inc - coloré.

8 5 22

Nombre total 20. 123 126 29 1 2 1 . 4 1.0. 3 .43 .0 .2. .43 0. 0 . 1.1. J 26-3-56 D

Année N° .	1957		Planche .		de &		U	१७ १८	.4	
1	! Nembre	I DATES								
1	! total	11/3	13/3			• •	i · ·		1 .	
! ! ! 1	6.	0.	3.	! ! • •		• : •	1	1	1	
2	1 .6.	2	3.					1	1	
3	1 . 6.	2.	3.					1		
A-				1			1	1	1	
! \$	1	1		1			1	1		
1	1	77:	e De	Ze 13-3	5-57			*	-	

11

Année : 1960

M 5	. Mahoisie de Lasserg	Planche	. 9 A 124		*	Côté	•	•	d
-----	-----------------------	---------	-----------	--	---	------	---	---	---

!	!Wombre ! total	! !	DATES							
!	1	18.3	112-3	! ! ! !	!	!!	!			
1 1	114	0	17 . 1	!!!!	!	1	!			
! 2	12	12	6 . !	!!!!	1	1	!			
! 3	112	! 0	16 + 1	!!!!!	1.	!	1			
! 4	12	! 4	19 . 1	!!!!!	!	!	!			
! 5	10	1	6 - !	De 11.	3-60x		!			

Année: 1961 Walvoisie de Easteraz Emplacement: 9 A 124 J 1558

	! Nombre!! total!	27/2/	3.3	6-3	DATES	
1	13	1	2	17 1		
2	1 12 !	0 !	2/	17 x !	!!!!!!!	
3	117	0	6	18		
4	115 1	1 !	21	17 !		
5	114	1 !	4	19 - 1		
6	!!!!!	!			Del 6.3-161x	
8	!!!	!		!!!	10 1 1 1	
9	i i	!		1 1	i i i i i	
10	!!!	!		1 1		
and the second second	1 !	. !		1 1	iiiii	

Désignation: Malvoisie de Lasseraz

VASSAL Planche 9 Côté A Nº 124 Souche 1 2(3) 45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- '41 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
 - 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 48 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 63 39 Clabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 6 cotonneuses 9.
- 44 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

1 2 MAI 1955 Truel

Désignation: Malvoisie de Lasseraz.

VASSAL

Planche 9 côté # No 124 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT,

Colonne

- épancul - moyen 5 - globuleux 6.

72 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

\$230 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotenneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truet 10 |5 |57

Nº ordre Désignation: Malvoine de Lasseraz VASSAL Planche 9 côté A Nº 124 souche 12045 (E) JEUNES FMUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux duveteux 8 - cotonneux 9 · 27 - sur nervures (7 - sur limbe (8). 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 · 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux ! - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 de à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2 . (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA PLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement 2 - partiellement 2 . 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à nocuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

10 9.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-

26 MAI 1955

Truel

Nº ordre

Designation: Molvoise de Lasseraz

VASSAL Planche 9 côté A Nº 124 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré † à raies ② vert 3.

 ventre coloré 7 à raies ⑧ vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon : coloré 7 vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Lordin 13-6-55

No ordre Malvoisie de hasseras Désignation VASSAL planche 7 côté A Nº124 souche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne (2)- grande 3. - Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan - en gouttière 2 - involute 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. -- Nervures : face supérieure : verte ①- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plambé 4 - autre 5. PETTOLE - long 1 - moyen (2) - court - glabre 4 - séteux 5 l'velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 f duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre & vev - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) / égal à 90° - (2) -

- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -

handier 16-8-55

supérieur à 90° (3)

supériour à 90° (3).

Nº ordre

Désignation

Malvoisie de la Geray

VASSAL planche 9 côté Angléouche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie : ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- Long 1 moyen(2)- court 3.
- glabre séteux 6 vilouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rouque 2-10-56

```
chalvoisie de Easseraz
    Désignation
             planche 9 côté A Nº 124 souche 1 2 3 4 5
                                     GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
    - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
    - A pédoncule herbacé(1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                      BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne(3) - Petite 4 - très petite
     de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte(4) - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident ] - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

Nº d'ordre

Money 12.9.56

Dénomination Malionie...cle. Zupercipg...... côté ...A.... Rang 124... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment 11 : grêle (1), fort (2). : ramifié (()), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2) à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4) Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (5), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2) : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniel 27-11-56

```
N° d'ordre: . . . . . . . Désignation: chalvoise de Lasseraz
Emplacement: . . . . . Vas. 9 A 124 . . Vign.
10 - L<sub>2</sub>/L . . . . . . . 1 - ©
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1-2-3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - X - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 -2-3
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : (1) - (2) - 3.
                  : 4-5
             Médiane/Base: 6 - 7 - 8
```

Rouques

```
No d'ordre : . . . . . . . Désignation : Multrousie de carrerei
Emplacement: 9 A124. Vas: . . . . Vign. . . . . . .
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 0 - 3 - 3.
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . 1 -(2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 -2 - 3 -
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(3) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 8 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : (1-2-3.
                : (4) - 5.
           Forme
           Médiane/Base : 6 - 7 - 8.)
```

Juliana

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

3512

Année:2008 grappgen08

Observateur:

CodeIntro: 0Mtp677

NomVar : Cépage non identifié

Nom introduction : Malvoisie de Lasseraz

Emplacement: Vass3R12s451-455

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9	4/3 306	15/3	4	
the forgue	13	1,12	15/3	13	
3 1	12	4/3046	14/3 DICENIU 6 8 11/3, 10 & 10/3	20	
4	M	4/3 3dil	14/3 1266 6413	9	
5	10		7 dib 04/3	14	
Moyenne	55		12/3	47	9

Date de Date de Début floraison Taux de Date de véraison début début moitié maturité aoûtement moitié nouaison (oiv 302) % (oiv 501) (oiv 304) (oiv 306) 22/5

Prior & 1915. Proche 1 F 28/5 Fécond & 2/05, + 9 Hours owners. X +1 18,6A

Formulaire de description 2/8

(stade floraison)

Année: 2008

Code cépage: 0Mtp677

Code introduction:

Nom introduction: Malvoisie de Lasseraz

Observateur: T)

Emplacement: Vass3R12s451-

Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 2.

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente 1 - en liseré 2 - partout 3.

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 -

forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 7 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1) - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées/1 / en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils couchés face inf. :nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible ? - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1/- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 -

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 4 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Formulaire de description 3/8

(stade floraison)

Année : 2008 Code cépage :

Code introduction: 0Mtp677

Nom introduction: Malvoisie de Lasseraz

Observateur:

Emplacement: Vass3R12s451-455

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3 horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9. oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge3.

oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3!

oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds: verte \(\mathbb{O} \)- verte \(\alpha \) raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte P- verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible B- moyenne 5 - forte 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence P- présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible P-moyenne 5 - forte 9.

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence D- présence 9.

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) 12 subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 37 moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud 1 - au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins 1 - 1,1 à deu 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4. oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base: absence 1 - présence 9.

oiv 501 **taux de nouaison** (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2 -aucune

000-21 Couleur des vrilles : jaune 1 – rouge clair 2 – rouge foncé 3 – vert

Bouton floral: petit 1 - moyen 2 - gros 3.

Formulaire de description 4 / 8
Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année : 2008 Code cépage :

Code introduction: 0Mtp677

Nom introduction : Malvoisie de Lasseraz

Observateur: TD

Emplacement: Vass3R12s451-455

		LIMBE			3K12S451	
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 065	Taille	Très petite	Petite	Moyenne	Grande	Très grande
Oiv 067	Forme du limbe	1-Cordiforme	2-Cunéiforme	3-Pentagon.	4-Orbicul.	5-Rénif.
Oiv 068	Nombre de lobes	1-F. entière	2-Trois	35Cinq	4-Sept	5- + de sept
Oiv 069	Couleur face supérieure limbe		Vert clair	Vertinoyen	Vert foncé	
Oiv 070	Pigmentation anthocyanique (rouge) des nervures, face supérieure	5 Nulle	2- Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- Après l ^{ère} bifurc.	
Oiv 071	Pigmentation anthocyanique (rouge) de nervures, face inférieure	[5Nulle	2- Point pétiolaire	3- Jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- Après 1 ^{ére} bifurc.	
Oiv 074	Profil du limbe	1-Plan	2-En V	3-Involuté	4-Révoluté	5-Tourmenté
Oiv 073	Ondulation du limbe (entre nerv l ou II)	Absente				Présente
Oiv 072	Gaufrure du limbe (dépression entre nervures I et II)	Absente				Présente
Oiv 075	Cloqûre du limbe, face sup. (relief entre nervures de dernier ordre)	Nulle à t. fb.	Paible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 084	Densité p. couchés entre nerv. face sup.	/ Nulle à 1. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 085	Densité p. dressés entre nerv. face inf.	Nulle at fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 086	Densité p. couchés des nerv. face sup. in	Nulle at. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 087	Densité p. dressés des nerv. face inf.	Nulle at. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 088	Villosité couchée nerv.principales face sup	Absente				Présente
Oiv 089	Villosité dressée nerv. principales face sup	Absente				Présente
Vassal	Densité p. couchés limbe face sup.	Nulle à t. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Vassal	Densité p. dressés limbe face sup.	Nulleat. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
		PETIOLE				11101010
Oiv 090	Densité poils couchés	Nulle à 1. fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 091	Densité poils dressés	Nulle at fb.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 093	Longueur pétiole p/r nervure médiane	Beaucoup plus court	Plus court	Égal	Plus long	Beaucoup plus long
	SINUS PETIOLAIRE (égaleme					
Oiv 079	Ouverture 1-très ouvert	2 ouvert	3- peu ouvert	4- fermé	5- lobes chevauchants	6- lobes très chevauchants
Oiv 080	Forme de la base	1- en U	2) en accolade	3- en V	chevadenants	Chevauchants
Oiv 81-1	Dent sur le bord	1- Absence	2- Préser	ice assez fréqu	uente de 1 ou :	2 dents
Oiv 81-2	Base dégarnie	A-Absence	The state of the s	3- sur 2 côtés		
	SINUS LATERAUX SUPERIEURS (é	galement observa	ble sur feuilles c	l'herbier, form	nulaire nº 7)	
Oiv 082	Ouverture	1- absence de sinus	2 ouverts	3- fermés	4- lobes très chevauchants	
Oiv 83-1	Forme	1- en U	2- en accolade	32 en V		
Oiv 83-2	Dent	1- Absence	2- Présence	fréquente		
	DENTS (également obser	vable sur feuilles	d'herbier, form	ulaire n° 7)		
Oiv 076	Forme	1- côtés concaves		3- notations 2+4	4- côtés convexes	5- un côté concave et
Oiv 077	Taille	Très petites	Pefites	Moyennes	Grandes	Très grandes
	Rapport longueur/largeur	Très courtes	Courtes	Moyennes	Longues	Très longues
	AUTRE CARACTER	E OBSERVABI	E A CETTE PE			- Torregues
Div 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	Très faible (<10%)	Faible (11-30%)	Moyen (31-50%)	Élevé (51-70%)	Très élevé (>80%)

Formulaire de description 5/8 (stade maturité) Année : 2008 Observateur: 8L Code introduction: 0Mtp677 Code cépage: Emplacement: Vass3R12s451-455 Nom introduction : Malvoisie de Lasseraz Grappe oiv 202 longueur: très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5 Valeur absolue (en cm.): 16 cm longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. oiv 203 largeur: très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm)(3)- moyenne (10-15 cm) 5 -Valeur absolue (en cm.): 9 large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9. oiv 206 longueur pédoncule : très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 moitié 5 - plus de la moitié 7. oiv 208 forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidal 2 - en entonnoir 3. oiv 209 présence d'un aileron : absent 1 - une à trois ailes 2 plus de trois ailes 3. Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 longue Valeur absolue (en mm.): 19 (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large Valeur absolue (en mm.): 16 (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3. oiv 223 forme: aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3) ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jauné 1) rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2. (quelques baies Legierment Rosses) oiv 227 pruine: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule: très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 épaisse 7 - très épaisse 9. oiv 229 ombilic: peu apparent 1 - apparent 2.) oiv 230 coloration de la pulpe : non colorée 1) colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non coloré 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe: peu juteuse 1 - juteuse 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7. oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9. oiv 236 saveur : aucune 1 goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5. oiv 238 longueur pédicelle: très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présent 3. oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - long 57 très longs 9. 728 mm oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9. oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absente 1 présentes 2. 000-11 axe de la rafle de la grappe : non coloré 2 coloré 1. Vassal: 000-18 région ombilicale : déprimée 1 – non déprimée 2.

Millerandage: nul à très faible 1 – faible 3 – moyen 5 – for (7) très fort 9.

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 2008

GrapGene06

Observateur:

Code cépage: 0

Code introduction: 0Mtp677

Nom introduction : Malvoisie de Lasseraz Emplacement : Vass3R12s451-455

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 32 aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence De présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1- présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 2 - très forte 9,

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 32- moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 800

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : _______

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1) – partiellement présente 2 – présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »